



药物滥用：健康的危险之路

徐涛 秦皇岛市山海关区妇幼保健机构生育服务中心

药物滥用问题日益严峻,对个人健康和社会稳定构成了巨大威胁。随着各类药物的普及和获取途径的多样化,滥用现象不断增多。药物滥用不仅严重危害使用者的身体健康,还可能引发一系列心理和行为问题,导致社会资源的浪费和犯罪率的上升。当前,全球范围内药物滥用现象普遍,各国政府和组织正积极采取措施应对。治理这一问题仍面临诸多挑战,需要社会各界共同努力。

1. 药物滥用的定义与概述

药物滥用,也被称为药物滥用症或药物依赖症,其定义通常包含两个方面:非医疗目的的药物使用以及持续使用药物导致身体、心理、社会功能损害的行为。药物滥用可包括过度使用处方药、滥用处方药、不法使用街头药物以及滥用常见的非处方药。药物滥用不仅包括照顾自身的人擅自修改药物用量和频率,也包括那些为追求快感、逃避现实或自我安慰而滥用药物的人。别的,部分人可能因社交压力或好奇心而尝试一些药物,但一旦陷入其中,就非常容易演变成药物滥用。这种行为会对个体的生理和心理健康产生重大威胁,甚至可能对其周围的社会环境产生负面影响。如长期药物滥用的人群往往会出现一些严重的精神障碍,例如焦虑症、抑郁症或者精神分裂症;从社会角度看,药物滥用会增加犯罪率、降低社区安全感、促进疾病传播等。

2. 药物滥用导致的社会问题

药物滥用无疑带来了一系列社会问题。首当其冲的,是犯罪率的升高。药物依赖者常常为获取更多药物不择手段,包括抢劫、盗窃甚至暴力等行为。部分药物滥用者为逃避困境,可能会进一步涉足贩毒等犯罪活动,影响社会治安。也有人抱着试一试的心态滥用药物,随着时间推移,可能形成依赖,无法自拔。药物滥用也极大地增加了社会公共卫生的支出。药物滥用者往往长期忽视个人健康,会发生各种由消化系统、泌尿系统、心血管系统

等疾病,甚至可能导致众多传染病的产生和传播,如艾滋病、丙型肝炎等。药物滥用对家庭和社群也是一种巨大的压力源。药物滥用者会因成瘾行为疏远家人和朋友,从而导致家庭破裂、人际关系紧张,对他人造成精神压力和经济负担。未成年人药物滥用也可能使其在学业,以及生活能力上严重受损。药物滥用还对就业市场产生不良影响。

3. 全球药物滥用现状与数据分析

全球药物滥用现状正成为越发严重的问题。根据世界卫生组织的数据,每年有近两百万人因滥用药物而过早丧生,这显示了问题的严重性。不仅在成熟的市场经济国家,药物滥用问题日益严重,在发展中国家,相应的情况也日益加剧。

药物滥用最为猖獗的三种物质是:阿片类药物、可卡因和大麻。具体的数据显示,全球有大约3500万人吸食阿片类药物,其中海洛因吸食者最多。可卡因在全球范围内的滥用者人数约为1800万人,这个数字在过去十年间持续增长。大麻的滥用者人数最高。在全球范围内,最令人关注的是15至35岁的年轻人药物滥用问题。相比其他年龄段,这个年龄段的药物滥用者比例特别高。药物滥用将对社会、家庭和个人产生深远影响。当然,药物滥用以及其后果的情况并非均衡分布,一些特定的社区、族群和地域的药物滥用问题更为严重,例如某些贫困地区、少数民族群体、战乱及灾难地区等,这进一步加大了药物滥用问题的解决难度。

结语:在摘要清晰地勾勒出药物滥用的定义,社会问题及全球情况后,看到的是一幅严重且不容乐观的画面。药物滥用无论在其广泛性或深度上都对全球社会安全构成威胁,更严重的是华泽它对人类健康造成的巨大破坏。这其中包含了深层次的社会问题,以及全球范围内的共同挑战。期待通过此研究,引发更多人对药物滥用问题的重视,积极寻找解决方案,从而减少它带给世界的危害。

日常习惯如何影响孩子的情绪健康

段铮 唐山市第五医院

在这个快节奏、高压力的时代,孩子的心理健康问题日益受到社会的关注。而事实上,许多看似微不足道的日常习惯,正悄然塑造着孩子们的情感世界。

一、规律作息：情绪稳定的基石

首先,让我们从最基本的规律作息谈起。孩子的身体如同精密的时钟,需要规律的作息来维持其正常的生理功能,包括情绪调节。不规律的作息时间会扰乱孩子的生物钟,导致睡眠不足或过度,进而影响体内激素的平衡,特别是与情绪紧密相关的血清素和多巴胺。缺乏这些“快乐激素”,孩子更容易出现易怒、焦虑或抑郁的情绪。

建议:家长应帮助孩子建立固定的作息时间表,包括上床睡觉和起床的时间,以及午休的安排。同时,减少晚间使用电子设备的时间,确保孩子有足够的睡眠环境。

二、健康饮食：滋养心灵的营养

饮食不仅是身体成长的燃料,也是情绪稳定的重要保障。高糖、高脂肪的快餐和加工食品不仅会导致孩子肥胖、营养不均衡,还会影响大脑的正常功能,增加情绪波动和攻击性行为的风险。相反,富含Omega-3脂肪酸、维生素B群和矿物质的食物,如鱼类、坚果、绿叶蔬菜等,有助于促进大脑发育,稳定情绪。

建议:鼓励孩子多吃新鲜蔬果、全谷物和优质蛋白质食物,减少垃圾食品的摄入。同时,注意孩子的饮水量,保持身体水分充足。

三、适量运动：释放压力的良方

运动不仅能够强健体魄,还是一种有效的情绪释放方式。适

量的运动可以促进血液循环,增加大脑中的氧气供应,有助于缓解紧张情绪,提升心情。对于孩子来说,户外游戏、跑步、游泳等活动都是不错的选择。

建议:每天至少安排半小时到一小时的户外活动时间,让孩子在运动中享受乐趣,释放压力。

四、积极社交：建立情感支持网络

人是社会性动物,孩子也不例外。良好的社交关系能够为孩子提供情感上的支持和安全感,有助于他们形成积极的自我认同和情绪调节能力。相反,孤独和社交障碍则可能加剧孩子的负面情绪。

建议:鼓励孩子参与集体活动,如学校的社团、社区的志愿者活动等,培养他们的团队合作能力和人际交往技巧。同时,家长也应成为孩子最坚实的后盾,倾听他们的心声,给予关爱和支持。

五、情绪管理教育：培养内在的力量

最后,情绪管理教育是培养孩子情绪健康的关键。教会孩子识别自己的情绪,理解情绪的起因和后果,以及运用积极的方式应对负面情绪,是每位家长和教育者的责任。

建议:通过故事、游戏、角色扮演等方式,向孩子传授情绪管理的知识和技能。同时,家长要以身作则,展示健康的情绪表达方式,为孩子树立榜样。

总之,孩子的情绪健康是一个复杂而多维的系统工程,需要我们 from 多个方面入手,共同呵护。通过培养规律的作息、健康的饮食、适量的运动、积极的社交以及情绪管理教育等良好的日常习惯,我们可以为孩子的情绪健康奠定坚实的基础。

肺结节与肺癌：如何区分和识别早期症状？

杜俊凤 沧州市中心医院

肺结节与肺癌的区分很关键。综合多种方法,可以提高早期肺癌识别率,争取更多治疗机会,改善生存率。

1. 肺结节与肺癌概述

肺结节是肺部直径小于3厘米的病变,可能是良性或恶性。肺癌是恶性肿瘤,分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌。虽然它们在影像学上相似,但生物行为不同。CT扫描能帮助识别肺结节的特征,评估是否有恶性风险。早期发现非常重要,定期检查可以帮助高危人群及时发现肺癌,提高治疗效果和生存率。医学界也在寻找新方法来更好地区分肺结节和肺癌。

2. 肺癌的影像学特征

肺癌的影像学特征在早期诊断中起着至关重要的作用。肺癌的影像学特征主要通过胸部X光片和胸部CT扫描来表现。胸部X光片常用于初步筛查,可能显示出异常阴影或肿块。X光片的分辨率有限,尤其是在早期小病灶的发现上存在不足。胸部CT扫描提供了更高的分辨率和更详细的图像,可以更精确地显示肺内的病变。CT影像可以清晰地显示肺癌的形态、大小、位置及其与周围组织的关系。典型的肺癌在CT影像上可能表现为不规则边缘、分叶状、毛刺状或出现胸膜凹陷的结节或肿块。中央型肺癌通常表现为中央气道的肿块伴有肺不张、阻塞性肺炎等征状,而周围型肺癌则多表现为孤立的肺结节或肿块。肺癌还可能伴有淋巴结肿大,尤其是纵隔和肺门区域的淋巴结。增强CT扫描通过对比剂的使用,可以帮助进一步确定病灶的性质,评估病灶的血供情况和病变的强化模式,有助于区分良恶性病变。PET-CT作为一种先进的影像学检查方法,结合了CT的解剖细节和PET的功能代谢信息,可以更准确地评估病灶的代谢活性,常用于鉴别恶性和良性病变,以及评估肺癌的分期和全身转移情况。

3. 肺结节与肺癌的病理学特征

肺结节和肺癌在病理学上有显著差异。肺结节通常是小于3厘米的局部病变,形态可以是圆形或类圆形,边缘多为光滑。病理检查发现,肺结节可能是炎症、肉芽肿或良性肿瘤等引起,其细胞分布和结构通常比较均匀,不表现出明显的恶性特征。肺癌则表现为恶性肿瘤,其病理特征包括细胞的异常增殖和分化异常,细胞核大且形态不规则,染色质浓密。肿瘤细胞常呈现浸润性生长,破坏周围正常组织,并有可能形成转移灶。肺癌的常见类型包括鳞状细胞癌、腺癌和小细胞肺癌,不同类型在病理上有各自的特征。例如,鳞状细胞癌多见于中央气道,细胞间桥明显,而腺癌多发生于外周肺组织,呈现腺管样结构。在组织学上,肺结节和肺癌的分界线在于细胞的增殖行为和结构特征。肺结节中,即使是增生性的结节,细胞排列也较为规则,核分裂象少见。相反,肺癌中细胞排列紊乱,核分裂象多见,核质比增加,胞质减少。肺癌常伴有肿瘤坏死和出血,而良性肺结节则较少出现这些病理变化。通过组织学和细胞学检查,医生能够区分肺结节和肺癌的病理特征,从而为早期诊断和治疗提供重要依据。

4. 鉴别诊断方法与技术

肺结节和肺癌的鉴别诊断很重要。医生会通过胸部X线和CT扫描查看肺部的影像,CT能更清楚地显示结节的特点。还可以用MRI和PET-CT来进一步检查。细胞学检查也是关键,医生会分析痰液或用支气管镜获取组织样本。若无法取得样本,还可以进行肺穿刺。血液检测一些标志物能帮助判断风险。人工智能也在帮助医生提高诊断准确性。

结语语:识别和区分肺结节与肺癌对于早期诊断和治疗至关重要。通过影像学 and 病理学的综合分析,可以有效提高诊断的准确性。早期发现和及时治疗有助于改善患者预后,降低肺癌的死亡率。公众和医疗专业人员应重视早期筛查,积极应用现代诊断技术,以便在肺癌早期阶段采取有效措施,挽救更多生命。

角膜炎的类型和预防措施：小心眼部卫生

曾勇 广西柳州市红十字会医院

角膜炎,一种严重的眼部疾病,由多种病原菌引起,对视力健康构成威胁。角膜作为眼睛的外层结构,其病变直接影响视力。常见的角膜炎类型包括细菌性、病毒性和真菌性,每种类型都有其独特的症状和治疗方法。为了预防角膜炎,我们需保持眼部卫生,避免感染。通过科学预防,我们能够守护视力健康,让视界保持明亮。

1. 角膜炎的基本概念与病因

角膜炎是角膜受到炎症影响的一种情况,严重威胁视觉健康。角膜是眼球前的透明层,保护眼睛并帮助聚焦光线。损伤角膜的疾病,特别是角膜炎,会大幅降低视力,甚至导致失明。

角膜炎的成因多样,常见因素有病毒、细菌等微生物感染,尤其在眼部卫生差时更易发生。隐形眼镜的不当使用、眼部外伤、眼干或过敏也可能导致角膜炎。其症状包括眼部红肿、异物感、视力下降和剧烈疼痛。出现这些症状应及时就医。

了解角膜炎及其成因对防治很重要。因角膜炎种类繁多,治疗和预防措施各异。保持眼部卫生、正确使用隐形眼镜、避免眼部外伤是预防关键。

2. 细菌性角膜炎的特点和治疗方法

细菌性角膜炎,作为一种由细菌感染引起的眼部疾病,其特点主要表现在眼痛、眼睑肿胀以及分泌物增多等方面。当角膜受到细菌侵袭时,会刺激局部神经,引起眼痛,并可能伴随畏光、流泪和眼睑痉挛等症状。此外,随着感染症状的加重,炎症可能会扩散到周边组织,导致眼险肿胀。同时,由于角膜受到炎症刺激,眼睛可能会出现大量脓性分泌物。

对于细菌性角膜炎的治疗,主要采用抗生素治疗,如妥布霉素滴眼液、氯霉素滴眼液等,这些药物能有效抑制细菌的生长和繁殖,从而缓解炎症。同时,保持良好的眼部卫生习惯,避免刺激性物质的接触,也是治疗过程中不可忽视的重要环节。

3. 病毒性角膜炎的特点和治疗方法

病毒性角膜炎是一种由病毒引起的眼部疾病,其特点在于结膜充血、角膜水肿、浸润和溃疡,严重时甚至影响视力。临床表现多样,轻者可能仅有结膜充血和角膜水肿,重者则可能出现角膜基质内的水肿、炎症,导致瞳孔反光减弱或消失,视力明显受损。

治疗病毒性角膜炎的关键在于对症治疗,使用抗病毒眼药水或凝胶来抑制病毒的复制和繁殖,降低角膜的炎症反应,并促进角膜的修复。医生会根据患者的具体病情,选择口服或静脉使用抗病毒药物进行治疗。

不同病毒引起的角膜炎,其病程和治疗方案也有所不同。例如,单纯疱疹病毒引起的角膜炎需要使用阿昔洛韦药物,而流感病毒引起的则可能需要奥司他韦药物。

4. 真菌性角膜炎的特点和治疗方法

真菌性角膜炎是由真菌感染导致的眼部疾病,常表现为剧烈眼痛、光敏和视力减退,角膜上可见白色或灰白色浸润斑块。该病与农业劳动、建筑工地等环境长期接触真菌密切相关,如接触带真菌的土壤、植物和鸟类粪便。此外,使用含真菌的眼药水或长期佩戴软性角膜接触镜也可能引发此病。

治疗真菌性角膜炎相对困难,因为许多抗真菌药物难以透过角膜到达病变部位。目前主要依赖全身或局部使用抗真菌药物,如氟康唑、伊曲康唑和那他霉素等。治疗过程中,定期复查至关重要,以确保病情得到控制。

预防真菌性角膜炎优于治疗。建议避免在高风险环境中受伤,眼部受伤后及时就医并按医嘱用药。眼部手术后,严格遵循医嘱,正确使用药物并定期随访。同时,注重眼部卫生,定期更换接触镜并清洗镜框。

结束语:角膜炎病因各异,需医生精准识别并治疗。预防角膜炎,重在维护眼部卫生,避免不良习惯和环境影响。日常保持眼部清洁,远离污染、病毒或真菌物品,定期眼科检查,构筑健康防线。守护角膜健康,方能享受清晰视界,让美好世界尽收眼底。

食品卫生常识：预防食源性疾病的关键措施

范亚宁 沧州市肃宁县疾病预防控制中心

了解食品安全知识,预防食源性疾病,确保每餐安全,是消费者和从业者共同使命。

1. 食源性疾病全球现状分析

食源性疾病,作为一种由食物传播的疾病,是全球公共卫生的重大挑战之一。数据显示,每年有数亿人因食物不安全而患病,千万人失去生命。食源性疾病涵盖了大量由细菌、寄生虫、病毒或化学物质引起的健康问题,从轻微的腹泻到致命食物中毒皆有涉及。具体而言,食源性病原体如沙门氏菌、埃希氏菌及李斯特菌,在全球范围内引发多起疫情。这些病原体主要通过受污染的肉类、未加工的乳制品、受污染的水及未完全清洗的蔬菜传播。食物链中的化学残留,如重金属和农药残留也会导致食源性疾病。尽管国际组织不断努力,推动食品安全标准与监管的全球化,但由于各地经济发展水平和卫生条件差异,食源性疾病的发生率有显著的地域性。发展中国家由于基础设施和食品监管体系相对薄弱,食品安全风险更高。全球化的贸易和旅行让食源性病原体有更多机会传播到不同地理区域,加剧了问题的复杂性。诸如此类的多因素相互作用,使食源性疾病成为了一个复杂且不断演变的全球性问题,亟需持续的关注与有效的应对策略。

2. 食源性疾病的主要诱因

食源性疾病泛指由食物传播的各种病原体所致的疾病,包括细菌、病毒和寄生虫等。这些病原体可以在生产、加工、储存和准备食物的过程中进入食品链。环境条件如温度和湿度的变化对它们的生存和繁殖影响巨大,若食物未能在适宜的条件下保存,可能导致微生物的迅速繁殖。其中,交叉污染是食源性疾病的一大诱因,未经彻底清洁的餐具和砧板,尤其是在处理生肉和熟食时,极易成为微生物交换的媒介。不仅如此,个人卫生习惯也扮演着关键角色,洗手这一简单的行为若被忽视,就可能成为疾病传播的渠道。食品在加工过程中的卫生处理又是一大关键点。如果食品未在足够的温度下烹饪,或者在烹饪后没有及时消耗,那么这些疾病原体就有机会存活甚至繁殖。农药和化肥的使用及残留,食品添加剂的超标应用以及生水和受污染的水源在农业生产和家庭烹饪中的使用,均可导致食源性疾病。再加上全球化贸易将食品跨境流通,不同标准和监管水平的碰撞同样会催生食源性疾病的风险。针对这些诱因,深入了解食品安全知识,提升食品处理的卫生标准无疑是预防食源性疾病的关键步骤。

3. 选择安全食材的重要性

选择安全食材是维护食品安全的第一道防线。安全食材的标准包括无毒、无害、新鲜和营养的特点,以及无污染、无添加和合法合规的要求。消费者在采购食材时,应注意查看产品标签上的生产日期、有效期限以及生产厂家信息,选择知名度较高且信誉良好的品牌。对于新鲜食材,如蔬菜、肉类和海产,应注意其色泽、气味和质地。新鲜蔬菜色泽鲜明,无异常斑点;肉类和海产则应有自然色泽,无异味,弹性足。购买时尽量选择当季食材,既保障了食材的营养价值,也降低了由于长途运输导致的食物变质的风险。对于有机食品的选择,虽然价格相对较高,但其不使用化学合成农药和化肥,较少受到农药残留和重金属污染的影响。在经济条件允许的情况下,有机食品是一个较为理想的选择。进食前,食材需要进行适当的处理,如彻底清洗、去皮和烹饪,这也是确保食品卫生的关键。把握好选择安全食材的方法,不仅能够减少食源性疾病的发生,还能为家人提供营养丰富、健康可口的餐食。

结束语:在当今社会,食源性疾病的影响不容忽视。通过深入了解其成因,选用安全食材,每个人都能为预防这类疾病发挥作用。饮食卫生的重要性日益凸显,人们应普及食品安全知识,增强自我保护意识。健康之路,食品安全是基石,预防胜于治疗,让安全饮食成为习惯,共同守护舌尖上的健康。